

**CLORETILO CHEMIROSA**  
**Cloruro de Etilo**

**COMPOSICION CUANTITATIVA**  
Cloruro de etilo 100 gramos.

**INDICACIONES**

Anestésico local en tratamiento previo a intervenciones quirúrgicas menores y en medicina deportiva.

**POSOLOGIA**

Según superficie y criterio médico.

**NORMAS PARA SU CORRECTA ADMINISTRACION**

Se coge el frasco con una mano, se presiona el pulsador con un dedo y se dirige el chorro de CLORETILO CHEMIROSA hacia la zona que se desea anestesiarse manteniendo el frasco a unos 30 cm de distancia. En 15 a 20 segundos se consigue la anestesia, que se manifiesta por el aspecto blanco y endurecido de la piel.

**CONTRAINDICACIONES**

Personas alérgicas al cloruro de etilo.

**PRECAUCIONES**

Por su carácter inflamable CLORETILO CHEMIROSA no debe utilizarse cerca de una llama. Aplicado sobre mucosas puede producir una ligera irritación.

**INCOMPATIBILIDADES**

No se han descrito.

**INTERACCIONES**

No se han descrito.

**EFECTOS SECUNDARIOS**

No se han descrito efectos secundarios en su utilización como anestésico local.

**INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO**

En caso de inhalación masiva accidental se puede producir narcosis e inconsciencia, ante lo cual se instaurará respiración artificial y tratamiento sintomático.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

**CONDICIONES DE CONSERVACION**

Debido al carácter volátil e inflamable del cloruro de etilo, deberá mantenerse en lugar fresco y alejado del fuego.

**PRESENTACION**

Frasco "spray" de 100 gramos.

**CON RECETA MÉDICA**

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Laboratorios ERN, S.A. Pedro, IV, 499 - 08020 Barcelona. España.

**RESPONSABLES DE LA FABRICACIÓN**

Laboratorios ERN, S.A. Gorcs i LLadó, 188 – 08210 Barberá del Vallés, Barcelona. España.

Laboratorios ERN, S.A. Perú, 228 – 08020 Barcelona. España.