

Taula 1. Signes i símptomes associats amb les etapes del contínuum de les infeccions de les ferides cròniques.

<p>Contaminació</p>	<p>Totes les ferides poden adquirir microorganismes. Si no hi ha condicions nutritives, i físiques adequades per a cada espècie microbiana, o no són capaços de evadir les defenses de l'hoste amb èxit, no es multiplicaran o persistiran; per tant, la seva presència és només transitòria i la curació de la ferida no es demora. Presència de microorganismes en un nombre inferior a 10.000 UFC*.</p>
<p>Colonització</p>	<p>Les espècies microbianes creixen i es divideixen però no causen dany a l'hoste. Presència de microorganismes en un nombre inferior a 50.000 UFC.</p>
<p>Colonització Crítica</p>	<p>El nombre de microorganismes o la capacitat de resposta de l'hoste, fan que la ferida no porti a un normal procés de cicatrització. Signes ocults (Subtils) de infecció local:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hipergranulació • Granulació sagnant, trencadissa • Ponts i bosses epitelials en el teixit granular • Descomposició i engrandiment de la ferida • Retràs en la curació de la ferida més del esperat • Dolor nou o augment del dolor • Augment de mala olor <p>Presència de microorganismes en un nombre inferior a 100.000 UFC.</p>
<p>Infecció Local</p>	<p>Els microorganismes es mouen més profundament en el teixit de la ferida i proliferen a una velocitat que invoca una resposta al hoste. Signes visibles (Clàssics) d'infecció local: Eritema, calor local, inflor, secreció purulenta. Presència de microorganismes en un nombre més de 100.000 UFC.</p>
<p>Infecció Sistèmica</p>	<p>Els microorganismes proliferen i es propaguen, fins a cert punt que els signes i símptomes s'estenen més enllà de les vores de la ferida. La propagació de la infecció pot implicar teixits, músculs, fàscia, òrgans o cavitats corporals.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extensió de la induració +/- eritema • Limfangitis • Crepitació • Descomposició / dehiscència de la ferida amb o sense lesions satèl·lits • Malestar / letargia o deteriorament general inespecífic • Pèrdua de gana • Inflamació, inflor dels ganglis limfàtics <p>Situació greu que pot provocar: Shock sèptic, falla d'òrgan, mort.</p>

*UFC: Unitats Formadores de Colònies