

Betatul®

Apósitos de uso tópico

Apósitos de tul malla hidrófila de 10 x 10 cm impregnados con un gel de Povidona
iodada

COMPOSICIÓN por apósito:

Povidona iodada 0,250g; Polietilenglicol 40, 4000, 6000; Agua c.s.p. 1 apósito

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:

Antiséptico

INDICACIONES:

Está indicada como antisepsia cutánea en:

- Quemaduras
- Heridas profundas
- Tratamiento complementario de úlceras (profundas, por decúbito, varicosas)

POSOLOGÍA:

Aplicación diaria o cada 2 días

MODO DE EMPLEO:

Abrir el sachet y quitar el plástico

Aplicar sobre la herida la compresa impregnada. Recubrir con una gasa o algodón. Sujetar por medio de una venda.

CONTRAINDICACIONES:

No debe ser aplicada a enfermos que presentan intolerancia al yodo.

INCOMPATIBILIDAD Y EFECTOS SECUNDARIOS:

No deben utilizarse al mismo tiempo derivados mercuriales

En los raros casos en que se produzca irritación de la piel o alergia, debe suspenderse el tratamiento.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO:

Lavado de la zona lesionada y aplicación local de antiinflamatorios, incluyendo los corticoides.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar con el Servicio de Información Toxicológica, teléfono: (91)5620420

PRESENTACIÓN:

Envase con 10 sachets de 1 apósito

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
SIN RECETA MÉDICA**

MEDA

Pharma SAU

Av. Castilla, 2 (P.E. San Fernando)

28830 S. Fdo. De Henares (Madrid)

Fabricante: Meda Manufacturing,

Burdeos (Francia)

Licencia MUNDIPHARMA AG. Suiza

